

# Cancer in the LGBTQ+ Community:

Prevention & Screening  
Identify, Reduce, Prevent



## Cancer disparities in the transgender community:

Cancer disparities in the transgender community are caused by multiple factors and barriers. These barriers may delay diagnosis and treatment of cancer and result in decreased survival of transgender patients, however data on cancer in this population are limited since most medical records do not collect gender identity.

## What we can do about it:

Cancer screening for transgender individuals should follow the same guidelines as outlined for cisgender individuals and should be based on what organs a transgender individual currently has. For example, a transman/AFAB (an individual who was born female and transitioned to male), should be screened for cervical cancer if they still have a cervix.

1 in 5\*

transgender individuals reported being refused care outright due to being trans or gender non-conforming.

## BARRIERS TO CARE

- Lack of medical insurance
- Discrimination in the healthcare setting
- High rates of smoking and alcohol use
- Higher risk of STIs leading to cancer, high rates of HIV infection
- Long-term impact of hormone use, especially hormones obtained without a prescription
- Lack of understanding by medical providers around gender dysphoria
- Lack of understanding by medical providers around transgender and non-binary bodies
- Medical records often fail to collect gender identity data, thus making research difficult
- Little to no doctor interaction or inquiry: patients never disclosed because they were never asked
- Patients question the relevance of their sexual orientation. (Heteronormative Bias)
- Fear of Discrimination

According to the National LGBT Cancer Network, 80% of oncologists feel they do not know enough to treat transgender patients

## GET SCREENED

To learn more, you can call, text, scan, or visit to get started today!

Text: "SCREEN" to 43386

Call: 833.727.3665

Visit: [go.rutgers.edu/LGBTQ-SNJ](https://go.rutgers.edu/LGBTQ-SNJ)

Scan:



Sources:

[https://www.cdc.gov/cancer/prostate/basic\\_info/get-screened.htm](https://www.cdc.gov/cancer/prostate/basic_info/get-screened.htm)

<https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/key-statistics.html>

[https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-prevention-pdq#\\_12](https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-prevention-pdq#_12)  
[sciencedirect.com/science/article/pii/S074920812300089X](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074920812300089X), doi:10.1016/j.

soncn.2023.151452.

# El cáncer en la comunidad LGBTQ+:

Prevención y detección  
Identificar, reducir, prevenir




## Las desigualdades del cáncer en la comunidad transgénero:

Hay múltiples factores y barreras que causan las desigualdades del cáncer en la comunidad transgénero. Estas barreras pueden retrasar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer y resultar en una menor supervivencia de los pacientes transgénero; sin embargo, hay pocos datos sobre el cáncer en esta población ya que la mayoría de los registros médicos no recopilan la identidad de género.

### Qué podemos hacer al respecto:

Las pruebas de detección del cáncer para personas transgénero deben seguir las mismas pautas que se describen para las personas cisgénero y se deben basar en los órganos que tiene actualmente una persona transgénero. Por ejemplo, un hombre trans/AFAB (persona que nació mujer y pasó a ser hombre) debe someterse a una prueba de detección de cáncer de cuello uterino si aún tiene ese órgano.



**1 de cada 5\***  
personas transgénero  
informaron que se les negó  
la atención por ser trans  
o género no conforme.

## BARRERAS PARA LA ATENCIÓN

- Falta de seguro médico
- Discriminación en los centros de salud
- Altas tasas de tabaquismo y consumo de alcohol
- Más riesgo de las ITS que conducen al cáncer y altas tasas de infección por VIH
- Impacto a largo plazo del uso de hormonas, en especial, las hormonas obtenidas sin receta
- Falta de comprensión por parte de los proveedores de atención médica sobre la disforia de género
- Falta de comprensión por parte de los proveedores de atención médica sobre los cuerpos transgénero y no binarios
- La falta habitual de los datos de identidad de género en los registros médicos, lo que dificulta la investigación
- Poca o ninguna interacción o consulta con médicos: los pacientes no informan porque nunca se les pregunta
- Los pacientes cuestionan la relevancia de su orientación sexual (sesgo heteronormativo)
- El miedo a la discriminación

Según la National LGBT Cancer Network (Red Nacional del Cáncer LGBT), el 80 % de los oncólogos sienten que no saben lo suficiente para tratar a los pacientes transgénero

## HÁGASE UNA PRUEBA DE DETECCIÓN

¡Para obtener más información y comenzar hoy, puede llamar, enviar mensajes de texto, escanear el código o visitar nuestra página!

Mensaje de texto: Envíe "SCREEN" al 43386

Teléfono: 833.727.3665

Visite: [go.rutgers.edu/LGBTQ-SNJ](https://go.rutgers.edu/LGBTQ-SNJ)

Escanee:



Fuentes:

[https://www.cdc.gov/cancer/prostate/basic\\_info/get-screened.htm](https://www.cdc.gov/cancer/prostate/basic_info/get-screened.htm)

<https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/about/key-statistics.html>

[https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-prevention-pdq#\\_12](https://www.cancer.gov/types/prostate/patient/prostate-prevention-pdq#_12)

[sciedirect.com/science/article/pii/S074920812300089X](https://sciedirect.com/science/article/pii/S074920812300089X), doi:10.1016/j.soncn.2023.151452.

Rev. 02.29.2024