



Cervical Cancer:

Prevention & Screening
Identify, Reduce, Prevent



What is cervical cancer?

Cervical cancer starts in the cervix, the narrow opening into the uterus from the vagina. Cervical cancer is most often caused by human papillomavirus (HPV), a sexually transmitted infection. It is the fourth most common type of cancer for women worldwide, but because it develops over time, it is also one of the **most preventable types of cancer**.



What causes cervical cancer?

- Over 90% of cervical cancer is caused by human papillomavirus (HPV)
- Having HIV (the virus that causes AIDS) or another condition that weakens your immune system
- Using birth control pills for a long time (five or more years)
- Having several sexual partners
- Having given birth to three or more children
- Smoking

What you can do about it:

- Know your family history
- Complete HPV vaccine series
- Talk to your doctor about which screening test is best for you and get screened regularly

GET SCREENED

To learn more, you can call, text, scan, or visit to get started today!

Text: "SCREEN" to 43386

Call: 833.727.3665

Visit: go.rutgers.edu/PreventCC

Scan:



Sources:

<https://www.nccc-online.org/hpvcervical-cancer/cervical-cancer-overview/>

https://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/risk_factors.htm

<https://seer.cancer.gov/statfacts/html/cervix.html>

<https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/safety-effectiveness.html>

<https://www.mdedge.com/obgyn/article/261917/gynecologic-cancer/current-approaches-and-challenges-cervical-cancer-prevention>



Rev. 02.06.2024


Cáncer de cuello uterino:

Prevención y detección
Identificar, reducir, prevenir



¿Qué es el cáncer de cuello uterino?

Este cáncer comienza en el cuello uterino, la abertura estrecha que va desde la vagina hacia el útero. La causa más frecuente del cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual. Es el cuarto tipo de cáncer más común en las mujeres en todo el mundo, pero como crece con el tiempo, también es uno de los **tipos de cáncer más prevenibles**.



1 de cada 8*

mujeres
tendrá un
diagnóstico
de cáncer
de cuello
uterino
en su vida.

¿Qué causa cáncer de cuello uterino?

- La causa de más del 90% de los cánceres de cuello uterino es el virus del papiloma humano (VPH)
- Tener VIH (el virus que causa el SIDA) u otra afección que debilite el sistema inmunitario
- Usar píldoras anticonceptivas durante mucho tiempo (cinco años o más)
- Tener varias parejas sexuales
- Haber dado a luz a tres o más hijos
- Fumar

Qué puede hacer al respecto:

- Sepa los antecedentes de su familia
- Complete la serie de vacunas contra el VPH
- Hable con su médico sobre qué prueba de detección es mejor para usted y hágase exámenes de detección con regularidad

HÁGASE UNA PRUEBA DE DETECCIÓN

¡Para obtener más información y comenzar hoy, puede llamar, enviar mensajes de texto, escanear el código o visitar nuestra página!

Mensaje de texto: Envíe "SCREEN" al 43386

Teléfono: 833.727.3665

Visite: go.rutgers.edu/PreventCC

Escanee:



Fuentes:

<https://www.nccc-online.org/hpvcervical-cancer/cervical-cancer-overview/>

https://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/risk_factors.htm

<https://seer.cancer.gov/statfacts/html/cervix.html>

<https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/safety-effectiveness.html>

<https://www.mdedge.com/obgyn/article/261917/gynecologic-cancer/current-approaches-and-challenges-cervical-cancer-prevention>

Rev. 02.29.2024